

Vacuna	2-8°C	22-25°C	35-37°C	>37°C	Observaciones
Polio oral	Estable durante 6-12 meses.	Inestable. 50% de pérdida de actividad después de 20 días	Muy inestable. Pérdida de títulos aceptables después de 1-3 días	50% de pérdida de actividad después de 1 día	Es una de las vacunas más sensible al calor. Se puede congelar. Debe protegerse de
Polio inactivada	Estable durante 1-4 años	Disminuye el nivel de antígeno del tipo 1 tras 20 días	Pérdida del nivel de antígeno del tipo 1 tras 20 días	*	No debe congelarse. Debe protegerse de la luz
DTP/DTPa	Estable durante 18-24 meses aunque con disminución de su potencia	Estabilidad hasta de 1-2 semanas	Algunas pierden el 50% de potencia después de 1 semana	A 45°C pierde el 10% de potencia por día. Pérdida rápida de actividad a 50°C	No debe congelarse
d/T	Estable durante 3-7 años	Estable durante meses	Estable durante 6 semanas	Estable durante 2 semanas a 45°C	
Triple vírica	Estable durante 18-24 meses.	Actividad satisfactoria durante 1 mes	Potencia satisfactoria durante 1 semana	50% de pérdida de actividad después de 2 días a 40°C	Debe protegerse de la luz. El liofilizado puede congelarse, NO el disolvente.
Hepatitis B (Engerix ó HBVAXPRO)	Estable durante 4 años	Estable durante meses	Estable durante meses	Estable durante 3 días a 45°C	No debe congelarse
Hepatitis A	Estable durante 2-3 años	15 días	1 semana	*	
Gripe	Válida sólo para el año que se ha preparado	No debe superar nunca los 20°C		*	No debe congelarse. Evitar la luz
Haemophilus influenzae b	Estable durante 2 años	Liofilizado estable durante 24 meses		*	
Neumocócica Polisacárida	Estable durante 2 años	Estable durante semanas a meses		*	No debe congelarse
Neumocócica Conjugada	Estable durante más de 2 años	Estable durante más de 2 años		*	
Tubía	Estable durante 3-5 años	Estable durante 18 meses	Estable durante 4 semanas	Estable durante varias semanas	Estable a la congelación
Papilomavirus (Cervarix)	30 días a 25°C			7 días a 35°C	No debe congelarse
Papilomavirus (Gardasil)5	130 meses ó más por encima de 25°C			Vida media de 18 meses	Por encima de 42°C, 3 meses. No debe sobrepasar los 50°C